


EXTRA TACKLE®


INSECTICIDA - GORGOJICIDA



TODAS LAS PLAGAS



TODOS LOS PRODUCTOS



TODOS LOS DESTINOS





EXTRA TACKLE®

INSECTICIDA - GORGOJICIDA



PARA TRATAMIENTO DE GRANOS ALMACENADOS SUBPRODUCTOS E INSTALACIONES

- ACOPIOS
- SEMILLEROS
- MOLINOS
HARINEROS
- MOLINOS
ARROCEROS
- INDUSTRIAS
DEL MAIZ
- FABRICA DE
BALANCEADOS
- MALTERIAS
- LEGUMBRERAS

- TRIGO
- MAÍZ
- ARROZ
- GIRASOL
- SORGO
- CEBADA
- SOJA
- LENTEJA
- POROTO
- ARVEJA
- PELLETS

COMPOSICION

EXTRA TACKLE es un insecticida desarrollado en base al principio activo DELTAMETRINA, sinergizado con Piperonil Butóxido, y especialmente adaptado al tratamiento preventivo de granos almacenados destinados a su posterior consumo, molienda ó industrialización.

*Inscripto en la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
SENASA con el N° 34.211*

CARACTERISTICAS GENERALES

EXTRA TACKLE presenta:

Prolongado efecto residual : 9 a 12 meses.

Control de plagas adultas en todo su espectro

Control de formas ocultas

(Inhibe el desarrollo de larvas cualquiera sea su estadio de evolución biológica)

Control de plagas resistentes e inmunes

(Acaros; Taladrillos; etc.)

Comprobada actividad de exclusión

(Inhibe reinfestación migratoria, insectos alados, piojos, ácaros , etc)

Poderosa acción de desalojo (Flush out)

PROPIEDADES

No deja residuos tóxicos, sabor extraño, ni transmite olor al grano ó subproducto tratado.

No altera el poder germinativo de las semillas.

Por tratarse de un producto practicamente inocuo para el ser humano y animales de sangre caliente, no ofrece riesgos a quien lo aplica, ni al medio ambiente.

No es corrosivo, esto permite el uso directo sobre instalaciones y complementarios sin peligro de deterioro.



IMPORTANTE

Los principios activos de este producto presentan licencia de admisión en el Mercado Internacional de granos según normas de la WHO (Tolerancia Internacional de la OMS).

Período de Carencia: El grano tratado y los subproductos que se obtengan de su molienda, podrán ser comercializados y/o consumidos de inmediato sin trabas ni riesgos, tanto en el mercado local como en el internacional.

EXTRA TACKLE ofrece este amplio margen de seguridad debido a que las dosis recomendadas son 2 a 3 veces inferiores al residuo permitido por el Codex Alimentario (FAO-OMS)



ESPECTRO DE ACCION

Gorgojos (*Sitophilus orizae*; *S. Zeamais*; *S. Granarius*);
Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella*);
Polilla de la fruta seca (*Plodia interpunctella*);
Carcoma achatada de los granos (*Laemophloeus* sp);
Carcoma dentada (*Oryzaephilus surinamensis*);
Carcoma grande de los granos (*Tenebroides mauritanicus*);
Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica*);
Tribolios de la harina (*Tribolium castaneum* y *Tribolium confusum*);
Acaro de la harina (*Acarus siro*);
Piojo de los granos (*Liposcellis divinatorius*);
Carcoma del tabaco (*Lasioderma sericorne*);
Falsa polilla de los graneros (*Tinea granella* L.);
Polilla de la harina (*Ephestia kuehniella* Zell.);
Polilla parda de la harina (*Pyralis farinalis* L.);
Gusanos de la harina (*Tenebrio amarillo* y *Tenebrio oscuro*);
Carcoma de la harina (*Laetheticus orizae* W.);
Escarabajo de la fruta seca (*Carpophilus hemipterus* L.).



INSTRUCCIONES DE USO DOSIS

Tratamiento a granel: 12/20 cm³ de EXTRA TACKLE diluidos en 400 - 800 cm³ de agua por tonelada para 6 -12 meses. Tratar los granos a medida que van ingresando al silo ó al realizar un trasile, con una pulverización fina y uniforme. Utilizar las dosis mayores en caso de mercadería infestada, ó cuando se requiera una mayor residualidad.

Embolsados: 50-80 cm³ de EXTRA TACKLE diluidos en 5 litros de agua para tratar 100 m² de superficie de estiba. Repetir la operación en las caras externas cada 4-6 meses.

Silos, depósitos, vagones, camiones, bodegas de barcos: 50-80 cm³ de EXTRA TACKLE diluidos en 5 litros de agua para tratar 100 m². Previo a la aplicación, efectuar una prolija limpieza, retirando desechos de granos y residuos, tanto en interiores como en exteriores. Repetir el tratamiento en exteriores cada 3-4 meses.

Uso en termoniebla: Diluir 30 cm³ de EXTRA TACKLE en 1 litro de gasoil para 1000 m³.

