

MAXIMO CONTROL DE PLAGAS

STOKER®

INSECTICIDA – GORGOJICIDA
Para termonebulizadora

Inscripto en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
SENASA Nº 36.535

PARA TRATAMIENTO DE
AMBIENTES E INSTALACIONES



Plantas de acopio de granos - Celdas y depósitos de maní
Molinos harineros, arroceros y semoleros
Fábricas y depósitos de alimentos - Malterías
Industria aceitera y legumbrera - Semilleros - Tabacaleras

STOKER

INSECTICIDA - GORGOJICIDA

Listo para usar en Termonebulizadora

GENERALIDADES:

STOKER es un insecticida desarrollado en base al principio activo Deltametrina, sinergizado con Piperonil Butóxido y D`Limonene, vehiculizado en propilenglicol.

APLICACIONES:

STOKER es un insecticida gorgojicida listo para usar por termonebulizado. Indicado para tratamiento desinfestivo de instalaciones y ambientes en: plantas de acopio, celdas y depósitos de maní, molinos harineros, arroceros y semoleros, industrias aceiteras y legumbreras, malterías, fábricas de balanceados, semilleros, tabacaleras, industria de la alimentación en general.



PARA TRATAMIENTO DE AMBIENTES E INSTALACIONES

STOKER

CARACTERÍSTICAS:

La combinación de los principios activos determina:

- Excepcional poder de volteo y mortandad
- Notable acción flush-out (desalojo)
- Control de formas ocultas cualquiera sea su estadio de evolución biológica.

El vehículo de STOKER produce una niebla de alta volatilidad, amplia dispersión y penetración. Esto permite que la acción del insecticida llegue a sitios de difícil acceso, donde generalmente se encuentran acantonadas las plagas.

STOKER determina:

- Máxima seguridad en operativos desinfestivos de ambientes cerrados.
- Triple efecto fulminante de acción.
- Poderosa acción de desalojo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Durante la aplicación de STOKER utilizar máscara panorámica con filtros para piretroides, guantes y delantal o mameluco impermeable.

Previo al tratamiento, se recomienda el barrido y limpieza de las instalaciones.

Termonebulizado: Después de cerrar todas las entradas de aire, dirigir la niebla en forma ascendente a las paredes y techos, de manera que la mayoría de los insectos entren en contacto con el vapor o niebla directa. La aplicación se comenzará por la parte más alejada a la puerta de salida, retrocediendo hacia la misma a medida que se completa el tratamiento. Una vez finalizado el tratamiento, mantener cerrado el sector durante por lo menos dos horas. Posteriormente, ventilar el ambiente durante 30 minutos, antes de retomar las tareas habituales.

Dosis: STOKER es un producto listo para usar, la dosis recomendada es de 1 litro para tratar por termonebulizado 1000 m³.

La operación puede repetirse periódicamente de acuerdo a la posibilidad de reinfestación migratoria de cada planta.



Motopulverizado y/o pulverizado:

Este tipo de aplicación se realiza dirigiendo la neblina hacia la superficie a tratar.

Dosis: STOKER se puede aplicar directamente como un producto listo para usar. En este caso la cobertura del tratamiento es de 3 meses.

Cuando se trata de grandes superficies, diluir 1 litro de STOKER en 5 litros de agua.


En este caso el período libre de plagas es de 60 días.

Hidrolavado:


La dosis de aplicación por sistema de hidrolavado es de 1 litro en 10 litros de agua.

Este tipo de tratamiento se realiza en celdas, silos y depósitos vacíos 2 veces al año.


FORMULAS DE CALCULO DE VOLUMEN




$$\text{Volúmen} = \frac{L \times W \times H}{3}$$



$$\text{Volúmen} = \frac{\pi \times D^2 \times H}{4 \times 3}$$




$$\text{Volúmen} = \frac{A + B}{2} \times H \times L$$



$$\text{Volúmen} = \frac{\pi \times D^2 \times H}{4}$$

CAPACIDAD DE DEPOSITOS CILINDRICOS



NOTA: Uniendo con una recta el diámetro, con la altura (en metros) obtenemos el dato de capacidad en metros cúbicos.

EN LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION

STOKER

MAXIMO CONTROL DE PLAGAS
EN AMBIENTES E INSTALACIONES

 **STOKER**

INSECTICIDA – GORGOJICIDA
PARA TERMONEBULIZADORA

Inscripto en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
SENASA N° 36.535

COMPOSICIÓN:

Deltametrina: isómero d-cis de alfa- ciano- 3 - fenoxibencil – 3 - (2,2 dibromovinil) -
2,2 dimetilciclopropano carboxilato 0,5 g
Sinergizantes: *Piperonil Butóxido* y *D`Limonene*
Vehículo: *Propilenglicol* c.s.p.100 cm³

ESPECTRO DE ACCIÓN:

Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica*)
Gorgojo del trigo (*Sitophilus granarius*)
Gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae*)
Gorgojo del maíz (*Sitophilus zeamais*)
Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella*)
Carcoma achatada de los granos (*Zaenophloeus minutus*)
Tribolio castaño (*Tribolium castaneum*)
Tribolio confuso (*Tribolium confusum*)
Polilla de la fruta seca (*Plodia interpunctella*)
Carcoma dentada de los granos (*Oryzaephilus surinamensis*)
Carcoma grande de los granos (*Tenebroides mauritanicus*)
Polilla de la harina (*Ephesthia kuehniella*)
Polilla del tabaco (*Ephesthia elutella*)



CIA. ASCARISCIER S.A.

03465 - 470036 / 470328

ASCARISCERSA@ARNET.COM.AR