

**Donde abunda
la comida
hace falta ... “El Postre”.**



**Raticida
Monodosico
con Kairomona**

Ascariscer ^{SUPER} CROP

Cía. Ascariscer S.A.

Tel.: 03465 - 470036 / 470328 - Whatsapp: +549 3465 593346
ascariscer@ascariscer.com.ar

Ascariscer

CEBO RATICIDA

SUPER
CROP
SENASA N°C-4043

ASCARISCER SUPER CROP es un raticida-rodenticida especialmente formulado para control de roedores en Puertos y Acopios. La variedad de kairomonas (poderosos atrayentes alimentarios) incluidas en su composición, atrae indistintamente a todas las especies de ratas y ratones presentes en ámbitos de almacenamiento de granos: **Acopios en general, Semilleros, Molinos harineros, Molinos arroceros, Fábricas de Alimentos Balanceados, Industrias del maíz, Aceiteras, Legumbreras, Maniceras, Depósitos de alimentos, Establecimientos rurales, Granjas, Feedlot, Criaderos de cerdos, Criaderos de aves, Tambos, etc.**

Composición:

Bromadiolone	0,005 gr.
Atractantes Especiales, Colorante, e inertes csp	100 gr.

Especies que controla

Rata gris de noruega (*Rattus norvegicus*), rata negra (*rattus rattus*), ratón doméstico o laucha (*Mus musculus*), rata colorada (*Holochilus brasiliensis*), ratón de campo (*Calomys sp.*, *Akodon sp.*).

Características

Su síntesis está adaptada al cebado en lugares donde abunda el alimento, el roedor **"prefiere" ASCARISCER SUPER CROP**.

- Se presenta en comprimidos parafinados.
- Es un producto resistente a la humedad extrema y a la formación de moho.
- Presenta máxima palatabilidad y atracción.
- Posee alto nivel de eficacia.

Mecanismo de acción

- ASCARISCER SUPER CROP es un rodenticida sintetizado en base al principio activo bromadiolone, anticoagulante de segunda generación. Interfiere el metabolismo normal de la vitamina K en el hepatocito, interrumpiendo la producción de protrombina y otros factores elementales en el mecanismo de la coagulación, provocando fragilidad capilar y hemorragias generalizadas.
- La muerte es semejante a la que se produce por debilidad o vejez; de este modo, no se genera recelo en la colonia. No requiere un período previo de cebado.

Instrucciones de uso – Dosis

Inspeccionar detenidamente el área tratando de visualizar signos (huellas, manchas de grasitud, excretas, roeduras, etc.) y posibles sitios de nidificación y alimentación. Determinar zonas activas y madrigueras.

Colocar ASCARISCER SUPER CROP en estaciones de cebado y disponerlas en aquellos sitios donde se haya detectado actividad.

En interiores, considerar que los roedores se desplazan en rozamiento permanente con paredes, por consiguiente, los sitios de cebado deben estar en ese camino.

La cantidad de puntos de cebado, y la dosis a utilizar, dependerá del grado de infestación y de las especies a controlar. Los puntos de cebado deben estar separados como máximo 5 metros.

Importante

- Es sumamente importante la reposición constante de los cebos, al mismo ritmo que son consumidos.
- Los tratamientos se realizan en cualquier época del año, en especial durante los períodos de reproducción (marzo-abril y septiembre-diciembre).