

LA SOLUCIÓN

ASCARISCER



NADA SUPERA A ...

YIP ROEMAT

RATICIDA PROTEGIDO LPU LÍQUIDO

ASCARISCER YIP ROEMAT, RATICIDA LÍQUIDO CERTIFICADO POR SENASA para tratamiento protegido en establecimientos en los cuales se almacenan o industrializan granos: Acopios en general, Puertos, Semilleros, Molinos harineros, Molinos arroceros, Fábricas de Alimentos Balanceados, Industrias del maíz, Aceiteras, Legumbreras, Maniseras, Depósitos de alimentos, Establecimientos rurales, Granjas, Feedlot, Criaderos de cerdos, Criaderos de aves, Tambos, etc.



Compañía Ascariscer S.A.

Whatsapp: +54 9 3465 59-3346

Tel: 03465-470036 / 470328 / 470606

ascariscer@ascariscer.com.ar

LA SOLUCIÓN

ASCARISCEER



YIP ROEMAT



SENASA N°: C-4045

APLICACIONES: Es un producto formulado especialmente para establecimientos en los cuales se almacenan o industrializan granos: Acopios en general, Puertos, Semilleros, Molinos harineros, Molinos arroceros, Fábricas de Alimentos Balanceados, Industrias del maíz, Aceiteras, Legumbreras, Maniseras, Depósitos de alimentos, Establecimientos rurales, Granjas, Feedlot, Criaderos de cerdos, Criaderos de aves, Tambos, etc.

COMPOSICIÓN

Bromadiolone.....0,005 gr
Atractantes especiales,
colorante e inertes.....csp 100cc

ESPECIES QUE CONTROLA

Rata gris, parda o de las cloacas (*Rattus norvegicus*)
Rata negra o de los techos (*Rattus ratus*)
Ratón o laucha (*Mus Musculus*)

MECANISMO DE ACCIÓN:

ASCARISCEER YIP ROEMAT es un raticida anticoagulante extremadamente eficaz para el control de ratas y ratones, de acción retardada. Su efecto comienza a registrarse al cabo de 4 o 5 días de iniciada la aplicación. Provoca fragilidad capilar y hemorragias generalizadas en el roedor. La muerte es semejante a la que se produce por debilidad o vejez; de este modo, no genera desconfianza en los roedores, permitiendo el control total de la colonia.

IMPORTANTE

- **ASCARISCEER YIP ROEMAT** llegó para resolver un problema de larga data.

En sitios o establecimientos donde abunda el alimento, el uso de raticida líquido protegido resulta más efectivo. Es conveniente eliminar cualquier fuente de agua que compita con el cebo líquido.

- Es importante el uso protegido de **ASCARISCEER YIP ROEMAT**, para evitar que sea consumido por especies no objetivo. Solicite la cebadera correspondiente para uso seguro.

MODO DE USO: Distribuir las cebaderas protegidas en lugares frecuentados por los roedores, respetando una distancia mínima de 10 metros entre ellas. Considerar que los roedores se desplazan en rozamiento permanente con paredes verticales, por consiguiente, los sitios de cebado deben estar en ese camino. Nunca colocar las cebaderas en el centro del local. La cantidad de cebaderas y la distancia entre ellas, dependerá de las dimensiones del lugar y del tamaño de la población a controlar. Verificar consumo cada 4 días, reponiendo según necesidad. Nunca debe faltar cebo líquido en las cebaderas. Normalmente, luego de 3 a 4 reposiciones se logra controlar la infestación.